


MONITORINGRESULTATEN 2017



Kopse Agrarische Natuurvereniging



MONITORINGSRESULTATEN 2017

WEIDEVOGELS BIJ DE KOPSE AGRARISCHE NATUURVERENIGING

Datum: November 2017

Opgesteld voor: Kopse Agrarische Natuurvereniging

Door:
Ton Fleeer

Benno Vaartjes



Bodelaecke
Diensten in Agrarisch- en Landschapsbeheer



INHOUDSOPGAVE

Voorwoord.....	- 4 -
1 Gevonden nesten en broedparen.....	- 4 -
1.1 Marker- en Oosterbroek	- 5 -
1.1.1 Broedparentelling	- 6 -
1.1.2 Alarmtelling.....	- 6 -
1.2 Blankenham.....	- 6 -
1.3 Leeuwterveld.....	- 8 -
1.3.1 Broedparentelling	- 8 -
1.3.2 Alarmtelling.....	- 8 -
1.3.3 Bruto territoriaal succes.....	- 10 -
1.4 Barsbekerbinnenpolder.....	- 11 -
1.4.1 Broedparentelling	- 12 -
1.4.2 Alarmtelling.....	- 12 -
1.4.3 BTS: Bruto territoriaal succes	- 12 -
1.5 Giethoorn-Noord	- 16 -
1.5.1 Broedparentelling	- 16 -
1.5.2 Alarmtelling.....	- 16 -
1.5.3 BTS: Bruto territoriaal succes	- 16 -
1.6 Kallenkote	- 19 -
2 Predatiebeheersing.....	- 22 -



Foto van vrijwillig plasdras op kavel H Doze, te Achtervelden/ Auken 27 april 2017

Voorwoord

Het seizoen 2017 ligt achter ons. In het evaluatierapport willen we weergeven wat de resultaten zijn, onze bevindingen en aanbevelingen.

Het seizoen begon vrij vroeg met de eerste legsels van de kievit, 11 maart werd het eerste ei gevonden door C. van Dijk in het Leeuwtveld. 19 maart kwam er bericht uit de Barsbekerbinnenpolder dat er een volledig broedsel lag. 8 april is het eerste jong gezien door H.Veldkamp.

In april was het droog, wat de voedselvoorziening voor de weidevogels niet ten goede kwam. Eind april weer een korte koude periode, wat weer een aantal jonge kieviten het leven heeft gekost.

Ook kwamen er begin april meldingen van beschermers binnen dat er veel gepredeerd was. In het Leeuwtveld dacht men ongeveer 40 % kwijt te zijn, wat in het begin van het seizoen zeer ongebruikelijk is. Er zijn geen sporen te vinden die op dierlijke predatie lijken, wat dan wel? Omdat het groeiseizoen van het gras wat later op gang kwam, hadden de vroege legsels dit jaar kans om uit te komen, maar toen men rond de 2^e week in mei massaal ging maaien, zijn er veel jonge kuikens verloren gegaan. Geprobeerd is door de beschermers met de boeren goed te overleggen, wat niet het gewenste resultaat heeft gehad.



Foto B Vaartjes 2017

1 *Gevonden nesten en broedparen.*

In dit hoofdstuk komen de verschillende weidevogelgebieden aanbod en hun individuele waarnemingen. De gebieden zijn onderverdeeld in vijf hoofdgebieden, namelijk;

- Marker- en Oosterbroek
- Blankenham
- Leeuwtveld
- Barsbeker Binnenpolder
- Giethoorn-Wanneperveen

Elk hoofdgebied heeft zijn eigen paragraaf met daarin de volgende onderdelen;

- Inleiding, en begrenzing van de leefgebieden zoals gehanteerd door het Collectief NWOverijssel
- Nesten, en broedparen waarnemingen,
- Alarmtellingen.
- Bruto Territoriaal Succes telling,

In de inleiding wordt een korte impressie gegeven van hoe we onze resultaten hebben kunnen behalen, en er onder andere in het gebied is gebeurd/ overkomen.

De uitkomsten van de nestentellingen zijn in de eerste sub paragraaf te vinden. Door de ervaring en het intensieve observeerwerk van de vele vrijwilligers en deelnemers aan het weidevogelbeheer, krijgen wij vrij nauwkeurige nesttellingen en soms kaarten aangeleverd met binnen welk gebied welke weidevogelsoorten en aantallen zijn gevonden.

De opvolgende sub paragraaf bevat de resultaten afkomstig van de door ons uitgevoerde alarmtelling rond de afloop van de verschillende beheerpakketten. Doordat wij ervoor kiezen om niet onnodig de weidevogels te verstoren is de alarmtelling niet zo nauwkeurig als de bovenstaande nestentelling of de per gebied uitgevoerde BTS-telling. Wel en veel belangrijker streven wij er naar om intensief te beoordelen welke beheerpakketten zinvol zijn om te verlengen door de aanwezigheid van kuikens.

Als derde paragraaf volgt de BTS-telling. In 2017 zijn niet in alle gebieden en BTS-telling gedaan. In overleg met het collectief is dit besluit genomen. Een volledige BTS-telling is uitgevoerd in de Barsbeker Binnenpolder, en in Het Leeuwtveld slechts een broedparentelling.

Voorafgaand aan de BTS-telling is ook dit jaar weer een cursus BTS-telling gegeven. Deze is gehouden in de BBBP op het bedrijf van H.Spans, de boerderij genaamd Weidevol. Deze cursus werd gegeven door P.v.d. Brandhof. Er waren 6 beschermers uit ons gebied die de cursus volgden. 2 mensen uit de Nop, die aanboden ons in Blankenham te helpen, hebben de cursus ook gevolgd. Verder volgden een 10-tal mensen uit de provincie ook de cursus. Op de dag van de cursus, werd gelijk de opgedane stof in de praktijk gebracht, dus een broedparentelling en alarmtelling in de BBBP.

1.1 Marker- en Oosterbroek

Op het Markerbroek is door de vrijwilligers A. v. d. Vlucht en Dinie Westerbeek gezocht. Zij hebben veelal stokken gezet. Op het Oosterbroek is door Dinie en Ton Fleeer gezocht en een deel door Sj. Bakker.


De broedparen- en alarmtelling is alleen gedaan op en nabij de stukken waar beheer op ligt. Op het Oosterbroek viel op dat er tegen het Wiede een 5-tal grutto-paren zaten, maar toen de boer aangaf te gaan maaien waren de grutto's verdwenen. Bij een andere boer, die het land pachtte van een makelaar, waren afspraken gemaakt, wanneer er zou worden gemaaid er bericht kwam, maar de loonwerker begon 12 uur eerder te maaien. Bij de controle was het gras gemaaid en 3 paar grutto-nesten en een wulpennest weggevaagd.

Er is maar een nest van een kievit uitgekomen, dit ook in overleg met de betreffende boer. Bij een te koop staande boerderij zaten 70 paar kauwen met nesten. Die hebben de zaak in het Oosterbroek behoorlijk kort gehouden. Voorstel hier is dat er volgend jaar in de singel samen met de brandweer de nesten worden ingekort.

Op het Markerbroek is het dit jaar ook minder met de weidevogels. Hier zijn met de boeren ook afspraken gemaakt, maar door de massale maaiactie door onder andere loonwerkers is hier toch wel wat fout gegaan. Bij een boer, waar stokjes bij de nesten stonden, was plots alles verdwenen, dus ook de nesten/jongen.

Bij de alarmtelling zijn er nog wel een aantal nesten/jongen beschermt en gered. Bij 2 nesten is succesvol uitgevlagd.

Advies voor deze 2 gebieden zou een paar plas-drassen zijn, die aangelegd zouden moeten worden. Een greppelplas-dras zou ook tot de mogelijkheden behoren.





1.1.1 Broedparentelling

Marker- en oosterbroek								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kievit	59	55	25	37	76	62	45	32
Grutto	18	30	22	7	16	32	18	4
Tureluur	7	4	2		5	25	8	5
Wulp			1			1	1	
Graspieper							5	
Veldleeuwerik								
Scholekster			2		7	10	2	1
Gele kwikstaart						2	2	
Krakeend				1	1			
Zomertaling							1	


1.1.2 Alarmtelling

Marker- en Oosterbroek					
	2013	2014	2015	2016	2017
Kievit		5	19	24	
Grutto	16	14	28	9	6
Tureluur	6	5	6	8	1
Wulp					
Graspieper					
Veldleeuwerik					
Scholekster		1	2		1
Gele kwikstaart					
Slobeend					



1.2 Blankenham

Ook dit jaar is er van de broedparen helaas nog weinig bekend door het ontbreken van vrijwilligers. Ondanks dat de hoop dat het dit jaar al zou lukken, hebben we er al het vertrouwen in het in 2018 wel lukt om vrijwilligers te vinden welke tijd hebben om de resultaten met ons vast te stellen en hopelijk door gerichte inzet





van pakketten en kennis vergroting bij grondgebruikers te vergroten.

Ondanks dat er geen compleet beeld van het leefgebied is valt wel op dat ook dit jaar de plasdrassen een succes zijn. En wel een veel groter succes dan vorig jaar. Zo zijn er, ondanks niet broedend, een tiental kemphanen in mie vast gesteld, welke ruim een week aanwezig waren. Hopelijk komen ze terug en wie weet volgend jaar een nest. Ook viel de veel hogere concentratie van grutto's en kuikens gedurende het gehele seizoen op, waardoor ook dit jaar de noodzaak en mogelijkheid tot verlenging van beheer pakketten nodig was en gegeven is.


Wat op valt is, dat de 2 plas-drassen een goede aantrekkingskracht hebben op de weidevogels. Zie foto onder.

De percelen met een beheer geven voor de weidevogels een goede dekking, maar de hier ook massale maaiactie in mei geeft toch ook weer een negatieve invloed op de resultaten.

Hier is een last-minute beheer toegepast om de plas-drasgebieden nog later te maaien. Hier waren vooral grutto en tureluurjongen aanwezig, wat dit beheer rechtvaardigde.

Geprobeerd wordt hier nog meer beheer neer te leggen en ook nog een plas-dras aan te leggen, wat de situatie nog meer kan verbeteren.





1.3 Leeuwterveld

De vermelde cijfers van het Leeuwterveld zijn afkomstig van de vogelwacht IJsselham, C.v.Dijk, Jan Mooijweer, Jan Mooiweer, Henk Veldkamp, Natuurmonumenten en boeren uit het gebied.

Na de melding van begin april, dat er veel nesten waren verdwenen, heeft er toch nog een redelijk herstel plaats gevonden.

Ook dit jaar is er voor een aantal boeren last-minute beheer toegepast.



1.3.1 Broedparentelling

Leeuwterveld								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kievit	145	83	64	169	152	206	118	119
Grutto	23	2	35	49	44	54	17	26
Tureluur	9	12	15	9	17	28	30	12
Wulp	1	5	10	5	9	6	7	8
Graspieper	4	21	15	17	17	19	14	19
Veldleeuwerik		5	6	2	5	5		3
Scholekster		6		4	5	5	1	4
Gele kwikstaar	3	4	4	1	3	8	8	16
Slobeend	2	7	8	4	7	4	1	2
Zomertalling		4	2		3	4	1	1
Wintertalling		2	1		2	2		
Kwartel					2	0		
Watersnip		8	5		5	3	1	1
Roerdomp					1	0		
Meerkoet	x	x	x	x	x	8	1	
Kraakeend					1	0		3

1.3.2 Alarmtelling

Leeuwterveld							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kievit	2	1	5	2	27	60	10
Grutto	11	11	10	11	28	10	15
Tureluur	5		1	5	30	8	8
Wulp				1	6	2	1
Graspieper	2				18	10	
Veldleeuwerik	3	1					
Scholekster					1		
Gele kwikstaar	4					6	4
Slobeend		1					

Tellingen laten voor 2017 zien, dat er meer broedparen zijn.
Bij de alarmtelling waren er nog maar weinig kievitsparen over.

Bij de Moespot is dit jaar in overleg met een boer op zijn maisland toch ook actie ondernomen om de legsels te verplaatsen tijdens de werkzaamheden op het land. Boer heeft hier zelf ook aan meegewerkt.



1.3.3 Bruto territoriaal succes

Leeuwterveld Klein 2017						
	Individu 01	Paar 02	Territoriaal 03	Nestindi- cerend 04	Nestlocatie 05	Alarmerende vogel(s) met jongen 06
Kievit	2	5	7	4	2	13
Grutto	1	26		3		14
Tureluur		8		3		6
Wulp	1			1	1	
Graspieper						
Veldleeuwerik			1	1		
Scholekster		1				
Gele kwikstaart	1					
Watersnip	1					
Bergeend						
Kuifeend						
Krakeend	1	1				
Slobeend		1				

Soort: ☒ Gele kwikstaart ☒ Graspieper ☒ Grutto ☒ Kievit ☒ Krakeend ☒ Tureluur ☒ Veldleeuwerik

☒ Kuifeend ☒ Scholekster ☒ Slobeend ☒ Watersnip ☒ Wulp ☒ Zomertaling

Gedrag: ☒ 01 Individu ☒ 02 Paar ☒ 03 Territoriaal ☒ 04 Nestindicerend

☒ 06 Alarmerende vogel(s) met jongen ☒ 07 Vliegvlug jong ☒ 08 Kuiken 0-10 dagen oud



Leeuwterveld BTS 2017			
	Aantal broedparen	Aantal gezinne n	BTS *
	week 18	week 22	
Grutto	44	0	0,0%
Tureluur	17	0	0,0%
Wulp	3	0	0,0%

In 2017 is er enkel een broedparentelling gedaan vandaar dat de BTS op 0 blijft staan.


1.4 Barsbekerbinnenpolder

In de BBBP heeft dit jaar een broedparen- en alarmtelling plaats gevonden door de mensen die de cursus van P. v. d. Brandhof hebben gevolgd. De 2 mensen uit Zwartsluis hebben ok een deel afgezocht en het buitendijkse deel gedaan. De 4 plas-drassen hebben duidelijk een positieve werking gehad, veel weidevogels die foerageren, wat nog niet in het aantal nesten/ broedparen terug te zien is.

Wat jammer is, dat van NM de boeren geen vaste mest mogen gebruiken op hun percelen, ook niet in het Leeuwterveld, wat de weidevogels volgens ons niet ten goede komt. Wat steeds weer op valt in de BBBP is dat er in de percelen grenzend aan de Woldweg nagenoeg geen weidevogels zitten. Oorzaak hiervan is

waarschijnlijk predatie vanuit het natuurgebied aan de ander kant van de Woldweg. Hier wordt gedacht aan boommarter.

Hier is ook last-minute beheer toegepast voor meerdere grutto-paren, veldleeuwerik en wulpen, allen alarmerend rondom het plas-dras van Boeve.





1.4.1 Broedparentelling

Barsbekerbinnenpolder								
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kievit	69	30	32	54	39	63	31	62
Grutto	60	52	22	19	16	18	16	18
Tureluur	21	24	7	6	6	11	14	8
Wulp		16	6	9	10	7	4	7
Graspieper	69	62	62	74	74	58	27	
Veldleeuwerik	8	10	9	9	8	12	14	15
Scholekster	6	4	4	6	6	7	0	4
Gele kwikstaar	9	10	7	6	10	13	0	1
Slobeend	12	13	7	9	5	3	0	1
Zomertalling	4	5	3	3	2	3	2	
Wintertalling	4	4	4	3	1	1	0	
Kwartel	6	9	5	6	6	8	3	
Watersnip					1	4	1	2
Kraakeend							2	

1.4.2 Alarmtelling

Barsbekerbinnenpolder				
	2014	2015	2016	2017
Kievit	1	4	13	4
Grutto		19	2	5
Tureluur		13	5	6
Wulp	2	8	5	2
Graspieper		9		
Veldleeuwerik				1
Scholekster			2	

1.4.3 BTS: Bruto territoriaal succes

Ondanks dat het BTS resultaat voor de grutto niet hoog is, is deze in totale aantallen en ook succes veel hoger dan vorig jaar, dit geldt ook voor de getelde tureluurs en wulpen.

De enige oorzaak welke er zichtbaar gevonden kan worden is het succes welke de 4 plasdras gebieden lijken te hebben, welke wij in de komende jaren verder van hopen te leren en verbeteren. Daarnaast hopen wij nog een nieuw plasdras gebied aan te leggen in de kern van het gebied.



Barsbeerbinnenpolder 2017						
	Individu 01	Paar 02	Territoriaal 03	Nestindi- cerend 04	Nestlocatie 05	Alarmerende vogel(s) met jongen 06
Kievit	5	1	4	4	10	4
Grutto		5	11	2	1	
Tureluur	4	4	1	2		
Wulp		1	6	1		
Graspieper			10			1
Veldleeuwerik				1		
Scholekster		4		2	2	
Gele kwikstaart		4				
Watersnip						
Bergeend						
Kuifeend	1	2				
Krakeend						
Slobeend		1				
Zomertaling			1			

Tabel BTS Broedparentelling

Soort: ☒ Gele kwikstaart ☒ Graspieper ☒ Grutto ☒ Kievit ☒ Krakeend ☒ Tureluur ☒ Veldleeuwerik
☒ Kuifeend ☒ Scholekster ☒ Slobeend ☒ Watersnip ☒ Wulp ☒ Zomertaling
 Gedrag: ☒ 01 Individu ☒ 02 Paar ☒ 03 Territoriaal ☒ 04 Nestindicerend
☒ 06 Alarmerende vogel(s) met jongen ☒ 07 Vliegvlug jong ☒ 08 Kuiken 0-10 dagen oud



Overzicht BTS Broedparentelling



Barsbeerbinnenpolder 2017						
	Individu 01	Paar 02	Territoriaal 03	Nestindi- cerend 04	Nestlocatie 05	Alarmerende vogel(s) met jongen 06
Kievit	1	2	1	7		9
Grutto			2	3	2	4
Tureluur	1		1	1	3	7
Wulp	1		2	3		6
Graspieper			1			
Veldleeuwerik			1	1		
Scholekster		1		3		
Gele kwikstaart			1			
Watersnip						
Bergeend						
Kuifeend						
Krakeend						
Slobeend						
Zomertaling						

Tabel BTS Alarmtelling

Soort: ☒ Gele kwikstaart ☒ Graspieper ☒ Grutto ☒ Kievit ☒ Krakeend ☒ Tureluur ☒ Veldleeuwerik
☒ Kuifeend ☒ Scholekster ☒ Slobeend ☒ Watersnip ☒ Wulp ☒ Zomertaling
 Gedrag: ☒ 01 Individu ☒ 02 Paar ☒ 03 Territoriaal ☒ 04 Nestindicerend
☒ 06 Alarmerende vogel(s) met jongen ☒ 07 Vliegvlug jong ☒ 08 Kuiken 0-10 dagen oud



Overzicht BTS Alarmtelling



Barsbekerbinnenpolder BTS 2016			
	Aantal broedpare n	Aantal gezinne n	BTS *
	week 18	week 22	
Grutto	4	0	0,0%
Tureluur	1	2	200,0%
Wulp	0	0	0,0%

Barsbekerbinnenpolder BTS 2017			
	Aantal broedpare n	Aantal gezinne n	BTS *
	5-mei	22-mei	
Grutto	19	4	21,1%
Tureluur	11	7	63,6%
Wulp	8	6	75,0%

Hier kun je zien, dat de BTS aardig naar boven is gegaan.

Door de plas-drassen hebben we nu ook een beeld, dat de weidevogels hier nu wat gaan aantrekken en dat we hopelijk volgend jaar dubbele aantallen kunnen melden.

1.5 Giethoorn-Noord

De resultaten in Giethoorn-Noord en omgeving zijn ook dit jaar weer goed te noemen. Ook in andere gebieden zoals Gelderingerpolder, Kanaaldijk, de Auken en aan de Worstslot zijn veel nesten gevonden en met name Kieviten.

In het gebied Giethoorn-Wanneperveen ging het goed. Kievit en watersnip waren heel goed terwijl grutto, tureluur en slobbeend stabiel waren. Dit gedeelte wordt door O.Brandsma belopen.

1.5.1 Broedparentelling

Giethoorn-Oost (Achtervelden, Zuidveen)							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kievit	22		?	13	?	14	14
Grutto	7	5	?	3	?		2
Tureluur	2	1	?	2	?		2
Wulp	3		?	1	?		1
Graspieper			?		?		15+
Veldleeuwerik			?		?		4
Scholekster	1		?	1	?	1	2
Gele kwikstaart			?		?		25+
Slobbeend			?		?		
Zomertelling			?		?		
Watersnip			?		?	3	4
Roerdomp			?		?		
Witte kwikstaart			?		?		2
Krakeend			?		?	1	

1.5.2 Alarmtelling

In 2017 is geen alarmtelling uitgevoerd door coördinatoren. Het gebied wordt door vrijwilligers nauwlettend in de gaten gehouden, en verder is er binnen het gebied veel zwaar beheer in combinatie met veel beheer van Natuurmonumenten waardoor het ingezette beheer heel gunstig is voor het broedsucces in het gebied.

1.5.3 BTS: Bruto territoriaal succes

Voor het eerst uitgevoerd, in opdracht van Collectief NWOverijssel, door Frans Parmentier. In onderstaande overzichten en tabellen valt op dat de aanwezigheid van de primaire kritische weidevogels nagenoeg ontbreekt, echter de watersnip komt in het voorseizoen van zijn broedperiode voltallig voor. Het aantal nest indicerende, of alarmerende aantal weidevogels valt gewoon tegen, waardoor de BTS voor het gebied op 0% uitkomt voor de grutto (en wulp en tureluur).

Wat niet in de resultaten naar voren komt, en nu voor het tweede jaar gemeld wordt is dat eind juni en in juli de kwartelkoning veelvuldig gehoord en zelfs gezien wordt door de grondgebruiker van het zuidelijk getelde deel.

De huidige BTS telling en inventarisatie van het gebied en de randen is uitgevoerd om nog in 2017 te gaan beoordelen of verder agrarisch weidevogelbeheer te verantwoorden is en in welke



vorm. Dit in overleg met de grondbeheerders, Natuurmonumenten, de KAN en Collectief NWOverijssel.

Met de door ons gehoopte zinvolle aanpak van het uit te voeren beheer en de inrichting van het gebied hopen wij als ANV De KAN dat het gebied zijn verdiende opleving krijgt. Dit door oa verstruiking in en opgaande begroeiing langs het gebied aan te pakken, er is inmiddels een bosje gekapt en door in het gebied vernatting toe te passen gedurende het gehele weidevogelseizoen.

Achtervelden Giethoorn-Noord 2017						
	Individu 01	Paar 02	Territoriaal 03	Nestindi- cerend 04	Nestlocatie 05	Alarmerende vogel(s) met jongen 06
Kievit				1		3
Grutto			1			
Tureluur						
Wulp				3		
Graspieper	3	4	17	5		
Veldleeuwerik						
Scholekster				2		
Gele kwikstaart	2					
Watersnip	9		2			
Bergeend						
Kuifeend		1				
Krakeend		2	1			
Slobeend						

Tabel BTS Broedparentelling



Soort: ☒ Gele kwikstaart ☒ Graspieper ☒ Grutto ☒ Kievit ☒ Krakeend
☒ Kuifeend ☒ Scholekster ☒ Slobeend ☒ Watersnip ☒ Wulp
 Gedrag: ☒ 01 Individueel ☒ 02 Paar ☒ 03 Territoriaal ☒ 04 Nestindicerend
☒ 06 Alarmerende vogel(s) met jongen ☒ 07 Vliegvlug jong ☒ 08 Kuiken 0-10 dagen




Overzicht BTS Broedparentelling

Achtervelden Giethoorn-Noord 2017						
	Individueel 01	Paar 02	Territoriaal 03	Nestindicerend 04	Nestlocatie 05	Alarmerende vogel(s) met jongen 06
Kievit		1	1			4
Grutto						
Tureluur						
Wulp				2		
Graspieper	3		27	16		1
Veldleeuwerik						
Scholekster				1		
Gele kwikstaart	1	1		1		
Watersnip						
Bergeend						
Kuifeend						
Krakeend						
Slobeend			1	1		1

Tabel BTS Alarmtelling



Soort: ☒ Gele kwikstaart ☒ Graspieper ☒ Grutto ☒ Kievit ☒ Krakeend
☒ Kuifeend ☒ Scholekster ☒ Slobeend ☒ Watersnip ☒ Wulp
 Gedrag: ☒ 01 Individueel ☒ 02 Paar ☒ 03 Territoriaal ☒ 04 Nestindicerend
☒ 06 Alarmerende vogel(s) met jongen ☒ 07 Vliegvlug jong ☒ 08 Kuiken 0-10 dagen oud
☒ 21-05-2017



Overzicht BTS Alarmtelling

	Achtervelden Giethoorn-		
	Aantal broedpare n	Aantal gezinne n	BTS *
	27-apr	21-mei	
Grutto	1	0	0,0%
Tureluur	0	0	0,0%
Wulp	3	0	0,0%

BTS 2017

1.6 Kallenkote

Kallenkote (-Wapserveen) is geen officieel weidevogelgebied voor kritische soorten, echter het wordt wel intensief afgezocht door de lokale vrijwilligers.

Het seizoen begon zeer matig waarbij met name op bouwland veel predatie (het leegroven van nesten) werd geconstateerd. Gedacht moet daarbij worden aan kraaien, vossen, marterachtigen, enz. enz. Vanaf mei ging het beter en zijn op het bouwland veel nesten uitgekomen, te zien aan de restanten van eierdoppen in het nest. Ook hebben we veel jonge vogels gezien.


Met name de kieviten lijken in eerste instantie in groepjes bij elkaar hun nesten te maken. Na de vele gevallen van predatie werden meer verspreid andere lokaties gezocht waarbij net ingezaaide



maïs of gepote aardappels en lieldvelden de voorkeur hadden. Veel van deze nesten zijn uitgekomen.

Bij het vinden van 5 nesten op één perceel vóór 15 april gaan we met de eigenaar in overleg om eventueel de werkzaamheden uit te stellen. In dat geval kan de eigenaar in aanmerking komen voor een vergoeding. Deze situatie heeft zich in Wapserveen niet voorgedaan, wel in Kallenkote en Eesveen. Dit heeft in Eesveen inderdaad geleid tot een vergoeding en tevens tot het aanleggen van een perceel plasdras bij den Hartog en Hornstra. De Agrarische Natuur Vereniging De Kop van Overijssel zorgt voor de verdere afwikkeling met de eigenaren.

Onderstaande grafiek laat de uitkomstresultaten zien vanaf 2008 t/m 2017. Gelukkig zien we dat, na een dip in 2015, het aantal uitgekomen nesten weer wat in de lift zit.



Helaas moeten we ook constateren dat nestpredatie fors is toegenomen. Oorzaken daarvan zijn naar onze mening de toename van het aantal predatoren en ook de intensivering van de landbouw. Beide onderwerpen krijgen gelukkig steeds meer aandacht van de instanties die hier enige invloed op zouden kunnen uitoefenen.

Onderstaande kaart geeft weer waar de nesten zijn gevonden. Tevens geeft de kleur het resultaat per nest aan.



☒ overige verliezen ☒ verlaten ☒ verzaamheden ☒ beveiding ☒ predatie ☒ aanwezig ☒ onbekend resultaat ☒ uit
 and
 ander doorzichtigheid beheerpakkettenlayer: Verberg | 75% | doorzichtig 50% | 25% | Niet doorzichtig Collectief Weidevogelbeheer 2017

2 Predatiebeheersing

In de onderstaande tabel staan alle geschoten vossen van de afgelopen jaren weergegeven, welke door de verschillende WBE's aan ons zijn verstrekt.

Gebied	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Marker- en Oosterbroek eo.	7	10	13	2	7	12	2	zie St'wold
Weerribben (incl Blankenham)			1	onb.	onb.	42	35	26
Leeuwtveld eo.			16	(zie BBBP	13	20	6	10
BBBP eo.			4	81	13	20	7	11
Giethoorn-Oost			4	(zie BBBP	11	20	14	11
Wanneperveen	x	x	x	(zie BBBP	x	20	7	11
Omgeving, vooral Steenwijkerwold		65	37	28	15	30	10	21
Totaal	65-75	75	75	111	59	164	81	90

Na de grote piek van 2015 en dip van 2016 is dit jaar weer een lichte stijging te zien in de afgeschoten vossen. Ondanks het intensieve beheer lijkt het aantal vossen niet af te nemen waar alle weidevogels last van hebben. Gelukkig stijgt het aantal ook niet significant. Een grote zorg is en blijft er wel van de vermoedelijke toename van overige predatoren zoals vele roofvogelsoorten, marterachtigen en ook boerderijkatten welke in de verschillende seizoenstadia nadrukkelijk aanwezig en actief zijn.

